<table>
<tr><th colspan="7">磁珠</th></tr>
<tr><th>分类</th><th>产品名称</th><th>产品型号</th><th colspan="2">规格</th><th>基本性能</th><th>应用领域</th></tr>
<tr><td rowspan="6">免疫学</td><td rowspan="2">蛋白A磁珠
白A磁珠试剂盒</td><td>XY-07-05</td><td>1 mL</td><td>5 mL</td><td rowspan="2">电镜尺寸：约1 μm、磁含量：35%-45%
表面电位：约-29 mV
SPA负载量：70-75μg/mg
浓 度：30 mg/mL</td><td rowspan="2">广泛适用于小体系、高通量IgG 纯化和标记、免疫沉淀（IP）、免疫共沉淀（Co-IP）、染色质免疫沉淀（ChIP）以及蛋白分离。该技术快速且温和，对靶蛋白的物理压力极小，尤其适用于分离和浓缩不稳定易分解的成分。SPA磁珠结合人IgG能力为1.6 mg/mL</td></tr>
<tr><td>XY-07-06</td><td>40 T</td><td>40T</td></tr>
<tr><td rowspan="2">蛋白G磁珠
蛋白G磁珠试剂盒</td><td>XY-07-07</td><td>1 mL</td><td>5 mL</td><td rowspan="2">电镜尺寸：约1 μm、磁含量：35%-45%
表面电位：约-26 mV
SPG负载量：70-85 μg/mg
浓 度：30 mg/mL</td><td rowspan="2">广泛适用于小体系、高通量IgG 纯化和标记、免疫沉淀（IP）、免疫共沉淀（Co-IP）、染色质免疫沉淀（ChIP）以及蛋白分离。该技术快速且温和，对靶蛋白的物理压力极小，尤其适用于分离和浓缩不稳定易分解的成分。SPG磁珠结合人IgG能力为1.8 mg/mL</td></tr>
<tr><td>XY-07-08</td><td>40 T</td><td>40T</td></tr>
<tr><td rowspan="2">蛋白A/G磁珠
蛋白A/G磁珠试剂盒</td><td>XY-07-09</td><td>1 mL</td><td>5 mL</td><td rowspan="2">电镜尺寸：约1 μm、磁含量：35%-45%
表面电位：约-26mV
SPA/G负载量：70-85 μg/mg
浓 度：30 mg/mL</td><td rowspan="2">广泛适用于小体系、高通量IgG 纯化和标记、免疫沉淀（IP）、免疫共沉淀（Co-IP）、染色质免疫沉淀（ChIP）以及蛋白分离。该技术快速且温和，对靶蛋白的物理压力极小，尤其适用于分离和浓缩不稳定易分解的成分。与SPA磁珠和SPG磁珠相比，SPA/G磁珠适合更多种类的IgG。SPA/G磁珠结合人IgG能力为0.9 mg/mL</td></tr>
<tr><td>XY-07-10</td><td>40 T</td><td>40T</td></tr>
</table>